井上石灰工業株式会社 第二営業グループ TEL 088-855-9965

## IC ボルドー66D 適用拡大のお知らせ!!

拝啓、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、当社製品「第 18645 号 IC ボルドー66D」が、<u>令和7年8月6日付け</u>で、 適用拡大となりましたのでお知らせ致します。 敬具

記

## IC ボルドー66D

## かんしょドローン散布・さといもドローン散布・かんきつ幹腐病 2 倍塗布

つきましては、お取引先へのご連絡並びに、今後の更なる「IC ボルドー」シリーズの普及 活動へのご協力をお願いいたします。取り急ぎ書面にてご連絡申し上げます。

## ICボルドー66D(今回適用拡大になった作物を抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の	使用	銅を含む農薬
					使用回数	方法	の総使用回数
かんしょ	基腐病	50 倍	100∼300ℓ/10a	発病前~ 発病初期	_	散布	
		2 倍	8ℓ/10a			Amt. 1 16-2-2-2-1666	
		4倍	16l/10a			無人航空機	_
		6倍	24l/10a			による散布	
さといも	疫病	100 倍	100∼300ℓ/10a	発病前~ 発病初期	_	散布	
		2倍	6l/10a			4年 人 65 7年後	
		4倍	12ℓ/10a			無人航空機	_
		6倍	18l/10a			による散布	
かんきつ	かいよう病、	2 倍	10l/10a 20l/10a	発病前~ 発病初期		無人航空機による散布	
	黒点病、そうか病、	4 倍					
	幹腐病	6 倍	30ℓ/10a				
	ナメクジ類、カタツムリ類	2 倍	10ℓ/10a	発生前~ 発生初期			
		4 倍	20l/10a 30l/10a				
		6 倍					
	かいよう病	25~200 倍	200~700ℓ/10a	発病前~ 発病初期		散布	_
	黒点病、そうか病	80 倍					
	幹腐病	50 倍					
		0 kt	0.3~0.50/樹				
		2 倍				<b>塗</b> 布	
	ナメクジ類、	0× 100 /-	200∼700ℓ/10a	発生前~		#6-	
	カタツムリ類	25~100 倍		発生初期		散布	

※尚、ご不明な点がございましたら弊社第二営業グループ(電話:088-855-9965)まで、 ご連絡をお願い致します。 以上