

ICボルドーは慣行ボルドー液を使いやすくした製剤です!

















農水省登録
第18645号

ICボルドー

660

1. 取扱簡単、水で薄めるだけで即OK。
2. 高品質微粒子設計でムダなく、ムラなく、目詰りなし。
3. 付着力抜群、薬効の持続性が長い。

散布例 ( 散布適期) ( 散布適期)

<p> かんきつ (ドローン)</p> <p>NEW かいよう病 2倍</p>		<p>新梢伸長期には 使用しない</p>		
	<p>発芽前</p>	<p>→</p>	<p>落弁直後</p>	<p>梅雨時</p>
<p> かんきつ</p> <p>かいよう病 25~200倍 黒点病 80倍 そうか病 80倍</p>		<p>新梢伸長期 (パラフィン系展着剤加用)</p>		
	<p>発芽前</p>	<p>→</p>	<p>落弁直後</p>	<p>梅雨時</p>
<p> かんきつ (ゆず)</p> <p>幹腐病 50倍</p>		<p>新梢伸長期 (パラフィン系展着剤加用)</p>		
	<p>発芽前</p>	<p>→</p>	<p>落弁直後</p>	<p>梅雨時</p>
<p> かんきつ (ゆず)</p> <p>幹腐病 2倍</p>	<p>幹腐病防除に高濃度で使用。 葉や果実にかからないよう注意。</p>		<p>年間を通じて、病斑部への処理</p>	
<p> かんきつ</p> <p>カタツムリ類 25~100倍</p>	<p>(梅雨前) 6月</p>	<p>全面散布</p>	<p>梅雨前に全面に散布する。(枝や幹にも十分に散布する。)</p>	<p>7月</p>
<p> かんきつ</p> <p>ナメクジ類 25~100倍</p>	<p>(梅雨前) 6月</p>	<p>主幹散布</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ナメクジは毎日巣に帰るので通り道をふさぐ。 ・ハウス栽培や、果実に薬剤をかけたくない時期でも処理できる。 ・新梢伸長期や夏場等でも処理できる。 	<p>全面散布</p>	<p>この部分に散布 (出来るだけ広く)</p>
	<p>全面散布</p>	<p>梅雨前に全面に散布する。(枝や幹にも十分に散布する。)</p>		

地域により又、気象条件等により散布時期は相違しますので、詳細は最寄のJA等関係指導機関にお尋ね下さい。