

桃と  
ネクタリンに

ICボルドーのINOUEから、いよいよデビュー!

**金属イオン** 亜鉛の力で桃を病害から守ります

農林水産省登録第24799号

# IC=ZINC

## 水和剤

せん孔細菌病に  
高い効果を発揮!



効き目  
コンダコル!

2  
収穫前日数  
制限なし

1  
細菌性の病害に  
効果を発揮

3  
生育期間中に  
使える  
無機殺菌剤





zinc  
**亜鉛**

**ICジンク**


有効成分 酸化亜鉛 97.0%

性状 白色～類白色 水和性粉末

毒性：普通物


**亜鉛イオンによる殺菌効果**

亜鉛イオンが病原菌の体内に浸し  
酵素系を阻害します。




**光触媒作用による殺菌効果**

酸化亜鉛が紫外線を浴びると活性酸素(O<sub>2</sub><sup>-</sup>や・OH)を生み出し、それが病原菌を強力に分解します。



**2 生育期間中に使える無機殺菌剤**

殺菌作用は銅剤と同様、主に金属イオンによるものであり、  
耐性菌の発生リスクが極めて低いです。



※2022年 社内試験



**3 収穫前日数制限なし**

炭酸カルシウム剤の加用が必要でないため、  
汚れがあまり目立ちません。




**登録内容**

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	酸化亜鉛を含む農薬の総使用回数
もも類	せん孔細菌病	1000倍	200～700L /10a	発病前～ 発病初期	8回以内	散布	8回以内

**使用上の注意 (抜粋)**


- 高温時の散布では薬害が発生する場合がありますので注意すること。
- もも及びネクタリンの無袋栽培で使用する場合、果実に汚れが生じるおそれがあるので注意すること。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
- もも類:発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間での使用に限る。

**散布時期**



**ICジンク委託試験成績**

試験年 2018年  
試験場所 福島県農業総合センター  
果樹研究所  
品 種 あかつき  
発生状況 少発生(接種)  
処 理 日 4/27、5/6 2回  
調 査 日 5/29



●使用前にはラベルをよく読んでください ●ラベルの記載以外には使用しないでください ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

ICジンクについてさらに詳しく!

**井上石灰工業株式会社** 蛭が丘オフィス  
CALCIUM CORPORATION  
〒783-0060 高知県南国市蛭が丘2丁目3番5  
https://www.inoue-calcium.co.jp/ TEL: 088-855-9965 (営業本部)