

■ ICボルドー66D(第18645号)

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数					
ぶどう	べと病	25~200倍	200~700L/10a	-	-	散布	-					
	晩腐病	100倍										
	さび病	50倍										
	黒とう病											
	べと病 晩腐病 さび病 黒とう病	2倍	20L/10a	-	-	無人航空機による散布						
		4倍	40L/10a									
		6倍	60L/10a									
おうとう	褐色せん孔病	40倍	200~700L/10a	-	-	散布	-					
	灰星病											
	樹脂細菌病											
うめ	かいよう病	50倍	200~700L/10a	葉芽発芽前まで	-	散布	-					
もも	せん孔細菌病	50倍	200~700L/10a	-	-	散布	-					
かんきつ	かいよう病	25~200倍	200~700L/10a	発生前~発生初期	-	散布	-					
	黒点病	80倍										
	そうか病											
	幹腐病	50倍										
		2倍	0.3~0.5L/樹	発生前~発生初期	-	塗布						
		25~100倍	200~700L/10a									
	ナメクジ類											
	カタツムリ類	かいよう病 黒点病 そうか病 幹腐病	2倍 4倍 6倍	10L/10a	発生前~発生初期	散布	無人航空機による散布					
	20L/10a											
	30L/10a											
	ナメクジ類 カタツムリ類	2倍 4倍 6倍	10L/10a 20L/10a 30L/10a	発生前~発生初期	-	散布						
びわ びわ(葉)	がんしゅ病	50倍	200~700L/10a	-	-	散布	-					
オリーブ オリーブ(葉)	炭疽病	50倍	200~700L/10a	-	-	散布	-					
あんず	かいよう病	50倍	200~700L/10a	-	-	散布	-					
マンゴー	かいよう病	40~50倍	200~700L/10a	-	-	散布	-					
キウイフルーツ	かいよう病	25~50倍	200~700L/10a	収穫後~発芽前	-	散布	-					
パッションフルーツ	アフリカマイマイ	50倍	200~700L/10a	発生前~発生初期	-	散布	-					
パパイヤ	アフリカマイマイ	50倍	200~700L/10a	発生前~発生初期	-	散布						

くるみ	炭疽病	50倍	200~700L/10a	—	—	散布	—					
	黒斑細菌病											
	褐斑病											
いちじく	株枯病	2~4倍	1~5L/樹	—	—	株元灌注	—					
あけび(果実) あけび(茎葉)	斑点細菌病	40倍	200~700L/10a	—	—	散布	—					
アボカド	炭疽病	50倍	200~700L/10a	—	—	散布	—					
野菜類	軟腐病	100倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
こんにゃく	腐敗病	40倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
	葉枯病	40~80倍										
ばれいしょ	疫病	50倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
かんしょ	基腐病	50倍	100~300L/10a	発生前～ 発生初期	—	散布	—					
		2倍	8L/10a			無人航空機に による散布						
		4倍	16L/10a									
		6倍	24L/10a									
さといも	疫病	100倍	100~300L/10a	発生前～ 発生初期	—	散布	—					
		2倍	8L/10a			無人航空機に による散布						
		4倍	16L/10a									
		6倍	24L/10a									
アスパラガス	斑点病	50倍	100~300L/10a	収穫終了後	—	散布	—					
	茎枯病											
	100倍											
トマト ミニトマト	疫病	50倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
にんにく	春腐病	50倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
	白斑葉枯病											
いちご	炭疽病	100倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
にんじん	黒葉枯病	50~100倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
薬用にんじん	斑点病	50倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
すいか	つる枯病	50倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
	炭疽病											
しょうが	白星病	50~100倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
茶	炭疽病	50倍	150~400L/10a	最終摘採後	—	散布	—					
	赤焼病											
ゆり	葉枯病	50倍	100~300L/10a	—	—	散布	—					
樹木類	斑点症 (シュードサーコスボラ菌)	50倍	100~700L/10a	—	—	散布	—					