

■ ICボルドー66D(第18645号)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
ぶどう	べと病	25～200倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
	晩腐病	100倍					
	さび病	50倍					
	黒とう病						
	べと病 晩腐病 さび病 黒とう病	2倍	20L/10a			無人航空機 による散布	
		4倍	40L/10a				
		6倍	60L/10a				
おうとう	褐色せん孔病	40倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
	灰星病						
	樹脂細菌病						
うめ	かいよう病	50倍	200～700L/10a	葉芽発芽前 まで	－	散布	－
もも	せん孔細菌病	50倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
かんきつ	かいよう病	25～200倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
	黒点病	80倍					
	そうか病						
	幹腐病	50倍					
		2倍					
	ナメクジ類	25～100倍	200～700L/10a	発生前～ 発生初期		散布	
	カタツムリ類						
	かいよう病 黒点病 そうか病 幹腐病	2倍	10L/10a	発病前～ 発病初期		無人航空機 による散布	
		4倍	20L/10a				
		6倍	30L/10a				
	ナメクジ類 カタツムリ類	2倍	10L/10a	発生前～ 発生初期			
		4倍	20L/10a				
		6倍	30L/10a				
びわ びわ(葉)	がんしゅ病	50倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
オリーブ オリーブ(葉)	炭疽病	50倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
あんず	かいよう病	50倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
マンゴー	かいよう病	40～50倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	－	散布	－
キウイフルーツ	かいよう病	25～50倍	200～700L/10a	収穫後～ 発芽前	－	散布	－
パッションフルーツ	アフリカマイマイ	50倍	200～700L/10a	発生前～ 発生初期	－	散布	－
パパイヤ	アフリカマイマイ	50倍	200～700L/10a	発生前～ 発生初期		散布	

くるみ	炭疽病	50倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	黒斑細菌病						
	褐斑病						
いちじく	株枯病	2～4倍	1～5L/樹	発病前～ 発病初期	—	株元灌注	—
あけび(果実) あけび(茎葉)	斑点細菌病	40倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
アボカド	炭疽病	50倍	200～700L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
野菜類	軟腐病	100倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
こんにゃく	腐敗病	40倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	葉枯病	40～80倍					
ばれいしょ	疫病	50倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
かんしょ	基腐病	50倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
		2倍	8L/10a			無人航空機に よる散布	
		4倍	16L/10a				
		6倍	24L/10a				
さといも	疫病	100倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
		2倍	8L/10a			無人航空機に よる散布	
		4倍	16L/10a				
		6倍	24L/10a				
アスパラガス	斑点病	50倍	100～300L/10a	収穫終了後	—	散布	—
	茎枯病			発病前～ 発病初期			
	100倍						
トマト ミニトマト	疫病	50倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
にんにく	春腐病	50倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	白斑葉枯病						
いちご	炭疽病	100倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
にんじん	黒葉枯病	50～100倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
薬用にんじん	斑点病	50倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
すいか	つる枯病	50倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	炭疽病						
しょうが	白星病	50～100倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
茶	炭疽病	50倍	150～400L/10a	最終摘採後	—	散布	—
	赤焼病						
ゆり	葉枯病	50倍	100～300L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—
樹木類	斑点症 (シュードサーコスポラ菌)	50倍	100～700L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—